


ULL AMB EL GLAUCOMA!



L'HI DIUEN LA CEGUERA SILENCIOSA.
NO DÓNA SÍMPTOMES
FINS QUE JA ESTÀ MOLT AVANÇADA.
DETECTA-LA A TEMPS.




FUNDACIÓ
FERRERUELA
SANFELIU

QUÈ ÉS EL GLAUCOMA?

El glaucoma és una malaltia crònica de l'ull en la qual vas perdent visió de manera tan gradual que no t'adones, podent arribar a causar ceguesa.

El més comú (glaucoma d'angle obert) produeix mal progressiu i irreversible del nervi òptic. Aquest està compost per més d'un milió de fibres nervioses (semblant a un cable elèctric conformat per molts petits filferros).

Quan aquestes fibres nervioses moren, es desenvolupen punts cecs en el nostre camp de visió, en la part més perifèrica.



EL 50% DELS AFECTATS PER GLAUCOMA NO SABEN QUE EL PATEIXEN. I TU?

Ets major de 60 anys?

Tens més de 40 anys i algun familiar pròxim amb glaucoma?

Ets d'origen africà o asiàtic?

Tens miopia o hipermetropia alta?

Tens alguna patologia ocular o has sofert alguna forta contusió?

Si creus que pots tenir algun factor de risc, visita al teu oftalmòleg.

SÍMPTOMES



Visió normal



Glaucoma inicial



Glaucoma avançat



Glaucoma extrem

En la majoria d'afectats no sol donar símptomes fins a fases avançades de la malaltia, quan el mal ocular és important.

La pèrdua de visió perifèrica no es nota perquè el cervell té la capacitat de compensar la visió perduda i emplenar les zones cegues combinant les imatges de tots dos ulls per a donar una imatge completa. Però en estadis avançats, s'arriba a una visió túnel.

El 50% dels afectats per glaucoma no saben que el pateixen.
Ull amb el glaucoma.
Visita al teu oftalmòleg.

PREVENCIÓ I DIAGNÒSTIC

Un diagnòstic precoç és la millor prevenció perquè la pèrdua de visió és irreversible, la visió perduda no es pot recuperar.

En una revisió oftalmològica s'examina:

- L'agudeses visual (AV).
- La pressió intraocular (PIO).
- El fons d'ull (FO) per a valorar l'estat del nervi òptic (NO).

TRACTAMENT I CURA

El glaucoma és una malaltia crònica que tot i que encara no s'ha trobat cura, es pot tractar i controlar mitjançant gotes, làser i/o cirurgia.

Amb el diagnòstic precoç, les revisions periòdiques, i el adequat i constant seguiment del tractament, podem frenar al glaucoma.

Col·labora:

ilo

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE
COL·LEGI L L E I D A

Més info:

Si desitgeu més informació us podeu dirigir personalment a la clínica ilo de Lleida o trucar al telèfon: 973 245 380